

## 9. keuhkosityöpää koskeva LuCE-raportti

Ääni kuuluviin – Euroopan keuhkosityöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tietämys ja päätöksenteko



## Tietämys keuhkosityövästä

Suomessa yhteistyössä:

SUOMEN  
SYÖPÖTILAAJAT RY

ENNEN DIAGNOOSIA

## Tietämys riskitekijöistä

 **82,8%**  
tupakointi **34,8%**  
asbesti **42,5%**  
passiivinen tupakointi **34,4%**  
sukurasite **38,5%**  
saasteet **21,5%**  
säteily

## Tietämys seulonnasta

Vain **40,6%** tiesi, mitä keuhkosityövän seulonta on**44,9%** ei tiennyt, onko asuinmaassa keuhkosityövän seulontaohjelmaa

## Tietämys oireista

Vain kaksi oiretta oli yli 50 %:n tiedossa

**72,5%**  
pitkittänyt yskä**52,6%**  
hengenhädätys

Seitsemän oiretta oli vain alle 15 %:n tiedossa

Yöhikoilu, luukipu, kuume, nielemisvaikeudet, rumpupalikkasormet, yläonttolaskimo-oireyhtymä (SVCO), patit/kyhmyt/turvotukset

## Viivytteli yhteydenottoa lääkäriin, koska

**46,5%**

ei tunnistanut keuhkosityövän oireita

**42,9%**

ajatteli oireiden liittyvän muihin sairauksiin

DIAGNOOSIN JÄLKEEN

## Tietämys keuhkosityövästä

**29,7%**  
ei pitänyt tietotasoaan keuhkosityövästä hyvänä**24,2%**  
ei ymmärtänyt taudin ennustetta hyvin**22,2%**  
ei tiennyt, oliko kasvaimesta testattu geenimutaatioita

## Tiedon puute hoidosta ja huolenpidosta

**46,9%**  
kliiniset tutkimukset**45,1%**  
palliativi-nen hoito**43,8%**  
biomarkkerit**28,6%**  
sädehoito

## MITÄ PITÄISI TEHDÄ?



- Lisätään tietoisuutta keuhkosityövästä ja varhaisesta havaitsemisesta sekä tuetaan riskien vähentämiseen tähtäviä hankkeita

- Edistetään yhteistä päätöksentekoa, jotta elämänlaatu paranee

## MENETELMÄT

Vastaukset perustuvat verkkokyselyyn (vastausaika 24.5.–7.7.2024). Kyselyyn vastasi 2 040 henkilöä (1 432 keuhkosityöpään sairastunutta ja 608 läheistä) 34:stä WHO:n Euroopan alueen maasta. Koko raportin voi lukea osoitteesta: [www.lungcancereurope.eu](http://www.lungcancereurope.eu)