

9° Rapporto LuCE sul cancro del polmone

Dare potere alle voci: conoscenza e processo decisionale tra le persone colpite dal tumore al polmone in Europa

Conoscenze sullo screening

In collaborazione in Italia con:



Conoscenza dei fattori di rischio

82,8%
Tabagismo

34,8%
Amianto

42,5%
Fumo passivo

34,4%
Storia familiare

38,5%
Inquinamento

21,5%
Radiazioni

Conoscenze sullo screening

Solo **il 40,6%** sapeva cosa fosse lo screening del cancro del polmone**44,9%** non sapevano se esisteva un programma di screening del cancro del polmone nel loro Paese

PRIMA DELLA DIAGNOSI

Conoscenza dei sintomi

Solo due sintomi erano noti da oltre il 50%

**72,5%**
Tosse persistente**52,6%**
Fiato corto

Sette sintomi erano noti solo da meno del 15%

Sudorazioni notturne; Dolore osseo; Febbre; Disfagia; Dita a bacchetta di tamburo; Ostruzione della vena cava superiore (SVCO); Nodi/grumi/gonfiore

Consulenza medica ritardata a causa di...

46,5%

non ha riconosciuto i sintomi del cancro ai polmoni

42,9%

attribuzione errata dei sintomi ad altre condizioni

DOPO LA DIAGNOSI

Conoscenza della malattia

29,7%
non aveva un buon livello di conoscenza della malattia**24,2%**
non ha capito bene la prognosi della malattia**22,2%**
non sapeva se il tumore fosse positivo per qualche marcatore

Mancanza di conoscenza del trattamento e della cura

**46,9%**
Sperimentazioni cliniche**45,1%**
Cure palliative**43,8%**
Biomarcatori**28,6%**
Radioterapia

INVITO ALL'AZIONE



- **Aumentare la consapevolezza sul cancro del polmone e sulla diagnosi precoce e sostenere gli sforzi di riduzione del rischio**

- **Consentire un processo decisionale condiviso per migliorare la qualità della vita**

METODOLOGIA

Risposte basate su un sondaggio online autocompilato (24 maggio - 7 luglio 2024) da 2.040 partecipanti (1.432 persone con cancro ai polmoni e 608 caregiver) provenienti da 34 Paesi della regione europea dell'OMS. Il rapporto completo è disponibile qui: www.lungcancereurope.eu

