

9. LuCE ziņojums par plaušu vēzi

Spēcinošas balsis: zināšanas un lēmumu pieņemšana, cilvēkiem kurus skāris plaušu vēzis Eiropā

Zināšanas par plaušu vēzi

Ar sadarbību Latvijā no:



Zināšanas par riska faktoriem



82,8%
Smēķēšanas vēstur



34,8%
Azbests



42,5%
Pasīvā smēķēšana



34,4%
Ģimenes vēsture



38,5%
Piesārņojums



21,5%
Starojums

Zināšanas par skrīningu



Tikai **40,6%** zināja, kas ir plaušu vēža skrīnings



44,9% nezināja, vai viņu valstī ir plaušu vēža skrīninga programma

PIRMS DIAGNOZES

Zināšanas par simptomiem

Vairāk nekā 50% zināja tikai divus simptomus



72,5%
Pastāvīgs klepus



52,6%
Elpas trūkums

Septiņus simptomus zināja tikai mazāk nekā 15%

Nakts svīšana; sāpes kaulos; drudzis; disfāģija; pirkstu pietūkums; augšējās dobās vēnas nosprostojums (SVCO); mezgli/puni/satūkumi

Novēlota medicīniskā konsultācija sakarā ar..

46,5%

neatpazīna plaušu vēža simptomus

42,9%

nepareizi attiecināja simptomus uz citām slimībām

PĒC DIAGNOZES

Zināšanas par slimību

29,7%
nebija pietiekamu zināšanu par šo slimību

24,2%
labi nesaprata slimības prognozi

22,2%
nezināja, vai audzējs bija pozitīvs uz kādu marķieri

zināšanu trūkums par ārstēšanu un aprūpi



46,9%
Klīniskie pētījumi



45,1%
Paliatīvā aprūpe



43,8%
Biomarķieri



28,6%
Radioterapija

AICINĀJUMS RĪKOTIES



• Palielināt izpratni par plaušu vēzi un agrīnu atklāšanu, kā arī atbalstīt riska samazināšanas centienus.

• Veiciniet kopīgu lēmumu pieņemšanu, lai palīdzētu uzlabot dzīves kvalitāti.

METODOLOĢIJA

Atbildes balstītas uz pašu aizpildītu tiešsaistes aptauju (no 2024. gada 24. maija līdz 7. jūlijam), kurā piedalījās 2 040 dalībnieki (1 432 cilvēki ar plaušu vēzi un 608 aprūpētāji) no 34 Eiropas reģiona PVO dalībvalstīm. Pilnīgs ziņojums ir pieejams: www.lungcancereurope.eu

