



9^e LuCE-longkankerverslag

Kennis en besluitvorming onder mensen die getroffen zijn door longkanker in Europa



Lung Cancer Europe

Kennis over longkanker

In samenwerking in Nederland met:



VÓÓR DE DIAGNOSE

Kennis over risicofactoren



82,8%
Geschiedenis van roken



34,8%
Asbest



42,5%
Passief roken



34,4%
Familiegeschiedenis



38,5%
Vervuiling



21,5%
Straling

Kennis over screening



Slechts **40,6%** wist wat longkankerscreening is



44,9% wist niet of er in hun land een screeningsprogramma voor longkanker bestaat

Kennis over symptomen

Slechts twee symptomen waren bekend bij meer dan 50%



72,5%
Aanhoudende hoest



52,6%
Kortademig

Zeven symptomen waren slechts bij minder dan 15% bekend

Nachtelijk zweten; Pijn in de botten; Koorts; Dysfagie; Trommelstokvingers; Obstructie van de superieure vena cava (SVC0); Knopen/knobbels/zwellingen

Vertraagde medisch advies wegens...

46,5%

herkende de symptomen van longkanker niet

42,9%

het verkeerd toeschrijven van symptomen aan andere aandoeningen

NA DE DIAGNOSE

Kennis over de ziekte

29,7%
had onvoldoende kennis over de ziekte

24,2%
begreep de prognose van de ziekte niet goed

22,2%
wist niet of de tumor positief was voor een marker

Gebrek aan kennis over behandeling en zorg



46,9%
Klinische proeven



45,1%
Palliatieve zorg



43,8%
Biomarkers



28,6%
Radiotherapie

OPROEP TOT ACTIE



- **Het bewustzijn van symptomen longkanker en vroege opsporing vergroten, en inspanningen ondersteunen om risico's te verminderen**
- **Samen beslissen mogelijk maken om de kwaliteit van leven te helpen verbeteren**

METHODOLOGIE

Antwoorden gebaseerd op een online enquête (24 mei - 7 juli 2024) van 2040 deelnemers (1432 mensen met longkanker en 608 zorgverleners) uit 34 landen van de WHO in de Europese regio. Het volledige verslag is hier te vinden: www.lungcancereurope.eu



Lung Cancer Europe

Many Faces, One Voice

➔ www.lungcancereurope.eu ✉ info@lungcancereurope.eu f X y o i n